



Portal Determinantes Sociais da Saúde
Observatório sobre Iniquidades em Saúde
CEPI-DSS/ ENSP/ FIOCRUZ

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030201 - Distribuição de mulheres de 25 anos e mais segundo tempo de realização do último exame preventivo de colo de útero, por ano, segundo região e escolaridade

Indicador	Distribuição de mulheres de 25 anos e mais segundo tempo de realização do último exame preventivo de colo de útero
Descrição	Distribuição percentual da população feminina de 25 anos e mais de idade, segundo tempo referido desde a realização do último exame preventivo para câncer do colo do útero, em determinado espaço geográfico.
Fonte	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - Suplemento Saúde
Método de Cálculo	Número de mulheres de 25 anos e mais por tempo referido desde a realização do último exame preventivo do câncer do colo do útero / População feminina de 25 anos e mais residente * 100
Categorização	Região, escolaridade, tempo de realização do último exame preventivo de colo de útero
Periodicidade	Eventual
Períodos disponíveis	2003, 2008
Notas	1. As proporções são calculadas desconsiderando os casos sem declaração e os não aplicáveis. 2. Informações da PNAD não disponíveis, até o ano de 2003, para as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP. 3. As categorias coletadas de tempo de realização do último exame em 2008 e 2003 são diferentes; foram aqui agrupadas para permitir a análise da série histórica.
Elaboração:	30/01/2012 CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ

Como citar

Ind030201 - Distribuição de mulheres de 25 anos e mais segundo tempo de realização do último exame preventivo de colo de útero, por ano, segundo região e escolaridade [Internet]. Rio de Janeiro: Portal Determinantes Sociais da Saúde. Observatório sobre Iniquidades em Saúde. CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ; 2012 Jan 30 [data de acesso com a expressão "acesso em"]. Disponível em: <http://dssbr.org/site/wp-content/uploads/2012/03/Ind030201-20120130.pdf>

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030201 - Distribuição de mulheres de 25 anos e mais segundo tempo de realização do último exame preventivo de colo de útero, por ano, segundo região e escolaridade

Período:2003, 2008

Região/Escolaridade	2003				2008			
	Menos de 3 anos	De 3 a 5 anos	6 anos ou mais	Nunca fez	Menos de 3 anos	De 3 a 5 anos	6 anos ou mais	Nunca fez
Região Norte								
0 a 3 anos	49,2	7,4	4,9	38,6	56,6	6,2	8,0	29,2
4 a 7 anos	67,0	6,7	3,3	23,0	72,2	5,8	5,0	17,0
8 a 10 anos	74,7	5,8	2,9	16,6	80,1	4,7	3,2	12,0
11 a 14 anos	77,7	4,0	1,5	16,7	84,0	3,7	2,6	9,8
15 anos e mais	85,6	4,4	2,1	7,9	88,0	3,5	1,9	6,6
Total	66,3	6,0	3,2	24,5	73,5	5,0	4,7	16,9
Região Nordeste								
0 a 3 anos	45,3	6,6	4,7	43,5	52,9	6,3	7,4	33,4
4 a 7 anos	66,5	6,9	3,3	23,2	70,7	5,8	5,1	18,4
8 a 10 anos	74,7	4,5	2,4	18,4	76,9	4,7	3,3	15,1
11 a 14 anos	79,0	3,9	1,6	15,5	80,2	3,4	2,3	14,1
15 anos e mais	85,3	3,6	1,3	9,8	86,5	2,3	2,1	9,2
Total	60,9	5,8	3,4	29,9	68,2	5,1	4,9	21,9
Região Sudeste								
0 a 3 anos	53,6	8,5	7,6	30,3	58,7	8,3	9,5	23,5
4 a 7 anos	70,8	8,2	5,2	15,7	74,6	7,0	6,4	12,0
8 a 10 anos	80,0	6,4	3,0	10,5	80,6	5,2	4,5	9,7
11 a 14 anos	82,3	4,9	2,4	10,5	84,9	3,8	2,2	9,1
15 anos e mais	87,6	3,9	1,9	6,6	88,9	2,7	2,5	5,8
Total	72,1	6,8	4,5	16,5	77,0	5,6	5,1	12,4
Região Sul								
0 a 3 anos	50,9	7,7	6,8	34,6	54,0	9,2	9,6	27,2
4 a 7 anos	68,0	7,5	4,6	19,9	72,6	5,8	7,7	13,9
8 a 10 anos	79,0	6,3	3,3	11,4	80,1	4,8	4,9	10,2
11 a 14 anos	82,5	5,2	2,2	10,2	84,8	4,4	2,9	7,9
15 anos e mais	89,6	3,9	1,2	5,3	89,4	3,0	2,2	5,5
Total	70,2	6,6	4,2	19,0	74,8	5,7	5,9	13,6
Região Centro-Oeste								
0 a 3 anos	56,8	7,3	5,1	30,8	59,8	7,3	7,7	25,3
4 a 7 anos	73,0	7,2	3,0	16,9	73,2	6,2	5,1	15,6
8 a 10 anos	76,7	4,7	2,3	16,2	78,0	5,3	3,7	13,1
11 a 14 anos	82,2	4,1	1,4	12,3	82,9	3,5	2,0	11,7
15 anos e mais	90,0	2,9	0,5	6,7	88,5	2,7	1,6	7,3
Total	72,6	5,8	2,9	18,7	75,3	5,1	4,2	15,4

Brasil

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030201 - Distribuição de mulheres de 25 anos e mais segundo tempo de realização do último exame preventivo de colo de útero, por ano, segundo região e escolaridade

Período:2003, 2008

Região/Escolaridade	2003				2008			
	Menos de 3 anos	De 3 a 5 anos	6 anos ou mais	Nunca fez	Menos de 3 anos	De 3 a 5 anos	6 anos ou mais	Nunca fez
0 a 3 anos	50,1	7,5	6,1	36,3	55,8	7,5	8,5	28,2
4 a 7 anos	69,4	7,7	4,5	18,5	73,1	6,4	6,2	14,3
8 a 10 anos	78,3	5,9	2,9	13,0	79,5	5,0	4,2	11,3
11 a 14 anos	81,3	4,6	2,1	12,0	83,6	3,8	2,3	10,3
15 anos e mais	87,7	3,8	1,6	6,9	88,5	2,7	2,3	6,5
Total	68,7	6,4	4,0	20,9	74,0	5,4	5,1	15,5

Fonte:

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - Suplemento Saúde

Notas:

1. As proporções são calculadas desconsiderando os casos sem declaração e os não aplicáveis.
2. Informações da PNAD não disponíveis, até o ano de 2003, para as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP.
3. As categorias coletadas de tempo de realização do último exame em 2008 e 2003 são diferentes; foram aqui agrupadas para permitir a análise da série histórica.

Elaboração: 30/01/2012
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ





Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030201 - Distribuição de mulheres de 25 anos e mais segundo tempo de realização do último exame preventivo de colo de útero, por ano, segundo região e escolaridade

Nunca fez

Período:2003, 2008





Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030201 - Distribuição de mulheres de 25 anos e mais segundo tempo de realização do último exame preventivo de colo de útero, por ano, segundo região e escolaridade

Nunca fez

Período:2003, 2008



Fonte:

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - Suplemento Saúde

Notas:

1. As proporções são calculadas desconsiderando os casos sem declaração e os não aplicáveis.
2. Informações da PNAD não disponíveis, até o ano de 2003, para as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP.
3. As categorias coletadas de tempo de realização do último exame em 2008 e 2003 são diferentes; foram aqui agrupadas para permitir a análise da série histórica.

Elaboração:

30/01/2012

CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ





Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030201 - Distribuição de mulheres de 25 anos e mais segundo tempo de realização do último exame preventivo de colo de útero, por ano, segundo região e escolaridade

Indicador

Período:2003, 2008





Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030201 - Distribuição de mulheres de 25 anos e mais segundo tempo de realização do último exame preventivo de colo de útero, por ano, segundo região e escolaridade

Indicador

Período:2003, 2008



Fonte:

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - Suplemento Saúde

Notas:

1. As proporções são calculadas desconsiderando os casos sem declaração e os não aplicáveis.
2. Informações da PNAD não disponíveis, até o ano de 2003, para as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP.
3. As categorias coletadas de tempo de realização do último exame em 2008 e 2003 são diferentes; foram aqui agrupadas para permitir a análise da série histórica.

Elaboração:

30/01/2012
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ