



Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203RNE - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e tipo de imunobiológico

Indicador	Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo
Descrição	Proporção (%) de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, em determinado espaço geográfico, no ano considerado
Fonte	Ministério da Saúde - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) Base demográfica do Ministério da Saúde Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
Método de Cálculo	$\frac{\text{Número de crianças com esquema básico completo na idade-alvo para determinado tipo de vacina}}{\text{Número de crianças na idade alvo}} * 100$
Categorização	Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e tipo de imunobiológico
Periodicidade	Anual
Períodos disponíveis	2000-2010
Notas	<ol style="list-style-type: none">1. Valores médios elevados podem encobrir bolsões de baixa cobertura em determinados grupos populacionais.2. A demanda da população não residente aos postos de vacinação, principalmente em campanhas, dificulta a avaliação da cobertura vacinal.3. A população-alvo utilizada para cálculo das coberturas vacinais é derivada da Base demográfica do Ministério da Saúde e/ou do Sistema de Informações sobre Nascidos vivos. Para detalhes do cálculo da população alvo, recomenda-se a leitura das Notas Técnicas do SI-PNI (http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/pni/cpnidescr.htm#pop).4. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.5. A vacina tríplice viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola), aplicada em crianças de 1 ano, foi adotada como parte do Programa Nacional de Imunizações a partir de 2002, substituindo a vacina contra sarampo, aplicada em crianças menores de 1 ano.6. Até 2002, está contabilizada a cobertura da vacina tríplice bacteriana (DPT); a partir de 2003, esta vacina foi substituída pela Tetravalente (DTP + Hib).7. O indicador apresenta valores acima de 100%, tanto por erros de registro das doses aplicadas como pela imprecisão das estimativas utilizadas da população alvo.
Data de elaboração	30/04/2013 CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ
Como Citar	Ind030203RNE - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e tipo de imunobiológico [Internet]. Rio de Janeiro: Portal Determinantes Sociais da Saúde. Observatório sobre Iniquidades em Saúde. CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ; 2013 Abr 30 [data de acesso com a expressão "acesso em"]. Disponível em: http://dssbr.org/site/wp-content/uploads/2013/05/Ind030203RM-20130430.pdf

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203RNE - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e tipo de imunobiológico

Período:2000-2010

Região/Imunobiológico	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Brasil											
Tetraivalente/DPT	94,7	97,5	98,6	97,5	96,1	95,4	100,5	103,1	98,2	99,5	97,7
Poliomielite	101,4	102,8	100,0	100,5	97,9	97,8	102,0	104,9	100,1	100,9	98,6
BCG	111,7	112,6	110,3	108,5	106,4	106,5	110,0	111,1	108,4	106,0	106,0
Hepatite B	91,1	91,9	91,5	92,0	90,3	91,3	97,4	99,7	96,3	98,0	95,7
Tríplice viral	96,9	113,0	105,0	99,7	102,2	104,9	101,3	101,8	99,9
Região Nordeste											
Tetraivalente/DPT	89,9	96,3	98,9	97,9	94,0	93,8	104,1	106,4	101,8	102,7	99,9
Poliomielite	97,2	103,7	99,1	100,0	96,2	96,1	106,0	108,3	102,4	103,0	100,0
BCG	114,3	117,6	113,8	111,7	108,5	107,6	115,7	117,5	110,9	108,6	107,6
Hepatite B	85,7	90,9	91,6	92,4	88,5	89,2	100,1	102,2	98,9	100,2	97,3
Tríplice viral	91,0	111,8	107,7	100,7	104,8	109,4	104,5	105,4	104,5
Fortaleza											
Tetraivalente/DPT	96,0	104,9	103,7	96,6	92,8	83,4	106,7	103,2	96,3	101,4	97,1
Poliomielite	101,2	109,4	100,2	94,1	100,4	89,4	116,2	105,2	100,5	100,5	95,9
BCG	127,4	130,1	122,7	113,4	109,9	110,5	131,3	126,5	111,6	118,6	117,9
Hepatite B	98,4	105,9	95,9	92,4	88,6	81,1	104,8	97,7	93,8	96,6	94,1
Tríplice viral/sarampo	124,2	114,4	104,2	118,1	101,8	94,5	110,1	99,9	99,2	103,0	105,1
Recife											
Tetraivalente/DPT	95,8	91,7	106,6	116,1	109,2	105,9	104,4	108,5	104,8	105,6	98,0
Poliomielite	115,9	102,9	104,5	123,2	105,6	113,3	106,1	110,2	107,9	103,7	96,1
BCG	144,1	129,9	139,3	141,1	130,2	121,4	122,8	122,2	123,0	119,4	117,4
Hepatite B	94,6	89,3	100,2	101,7	98,9	98,0	96,4	104,6	103,9	100,2	93,5
Tríplice viral/sarampo	121,0	114,4	116,0	127,4	115,6	111,7	107,5	110,5	107,3	111,5	105,2
Salvador											
Tetraivalente/DPT	94,7	84,3	86,4	84,9	82,8	82,1	104,4	94,4	87,4	93,6	92,7
Poliomielite	114,4	115,2	97,8	91,1	85,9	87,5	107,3	97,3	85,9	90,8	90,0
BCG	121,8	115,1	114,8	117,5	116,0	111,1	131,1	117,5	105,5	110,2	113,7
Hepatite B	90,3	76,8	75,1	75,6	74,3	77,9	98,4	89,9	83,4	90,9	90,2
Tríplice viral/sarampo	129,9	93,9	92,1	116,1	117,4	98,2	107,1	102,0	90,6	99,1	98,8

Fonte:

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203RNE - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e tipo de imunobiológico

Período:2000-2010

Região/Imunobiológico	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Ministério da Saúde - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Notas:

1. Valores médios elevados podem encobrir bolsões de baixa cobertura em determinados grupos populacionais.
2. A demanda da população não residente aos postos de vacinação, principalmente em campanhas, dificulta a avaliação da cobertura vacinal.
3. A população-alvo utilizada para cálculo das coberturas vacinais é derivada da Base demográfica do Ministério da Saúde e/ou do Sistema de Informações sobre Nascidos vivos. Para detalhes do cálculo da população alvo, recomenda-se a leitura das Notas Técnicas do SI-PNI (<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/pni/cpnidescr.htm#pop>).
4. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.
5. A vacina tríplice viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola), aplicada em crianças de 1 ano, foi adotada como parte do Programa Nacional de Imunizações a partir de 2002, substituindo a vacina contra sarampo, aplicada em crianças menores de 1 ano.
6. Até 2002, está contabilizada a cobertura da vacina tríplice bacteriana (DPT); a partir de 2003, esta vacina foi substituída pela Tetravalente (DTP + Hib).
7. O indicador apresenta valores acima de 100%, tanto por erros de registro das doses aplicadas como pela imprecisão das estimativas utilizadas da população alvo.

Data de elaboração: 30/04/2013
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ





Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203RNE - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e tipo de imunobiológico

Tetralente/DPT

Período:2000-2010




Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203RNE - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e tipo de imunobiológico

Tetraivalente/DPT

Período:2000-2010



Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Notas:

1. Valores médios elevados podem encobrir bolsões de baixa cobertura em determinados grupos populacionais.
2. A demanda da população não residente aos postos de vacinação, principalmente em campanhas, dificulta a avaliação da cobertura vacinal.
3. A população-alvo utilizada para cálculo das coberturas vacinais é derivada da Base demográfica do Ministério da Saúde e/ou do Sistema de Informações sobre Nascidos vivos. Para detalhes do cálculo da população alvo, recomenda-se a leitura das Notas Técnicas do SI-PNI (<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/pni/cpnidescr.htm#pop>).
4. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.
5. A vacina tríplice viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola), aplicada em crianças de 1 ano, foi adotada como parte do Programa Nacional de Imunizações a partir de 2002, substituindo a vacina contra sarampo, aplicada em crianças menores de 1 ano.
6. Até 2002, está contabilizada a cobertura da vacina tríplice bacteriana (DPT); a partir de 2003, esta vacina foi substituída pela Tetraivalente (DTP + Hib).
7. O indicador apresenta valores acima de 100%, tanto por erros de registro das doses aplicadas como pela imprecisão das estimativas utilizadas da população alvo.

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203RNE - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e tipo de imunobiológico

Tetraivalente/DPT

Período:2000-2010

Data de elaboração: 30/04/2013
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ





Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203RNE - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e tipo de imunobiológico

Poliomielite

Período:2000-2010




Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203RNE - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e tipo de imunobiológico

Poliomielite

Período:2000-2010



Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Notas:

1. Valores médios elevados podem encobrir bolsões de baixa cobertura em determinados grupos populacionais.
2. A demanda da população não residente aos postos de vacinação, principalmente em campanhas, dificulta a avaliação da cobertura vacinal.
3. A população-alvo utilizada para cálculo das coberturas vacinais é derivada da Base demográfica do Ministério da Saúde e/ou do Sistema de Informações sobre Nascidos vivos. Para detalhes do cálculo da população alvo, recomenda-se a leitura das Notas Técnicas do SI-PNI (<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/pni/cpnidescr.htm#pop>).
4. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.
5. A vacina tríplice viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola), aplicada em crianças de 1 ano, foi adotada como parte do Programa Nacional de Imunizações a partir de 2002, substituindo a vacina contra sarampo, aplicada em crianças menores de 1 ano.
6. Até 2002, está contabilizada a cobertura da vacina tríplice bacteriana (DPT); a partir de 2003, esta vacina foi substituída pela Tetravalente (DTP + Hib).
7. O indicador apresenta valores acima de 100%, tanto por erros de registro das doses aplicadas como pela imprecisão das estimativas utilizadas da população alvo.

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203RNE - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e tipo de imunobiológico

Poliomielite

Período:2000-2010

Data de elaboração: 30/04/2013
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ





Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203RNE - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e tipo de imunobiológico

BCG

Período:2000-2010




Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203RNE - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e tipo de imunobiológico

BCG

Período:2000-2010



Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Notas:

1. Valores médios elevados podem encobrir bolsões de baixa cobertura em determinados grupos populacionais.
2. A demanda da população não residente aos postos de vacinação, principalmente em campanhas, dificulta a avaliação da cobertura vacinal.
3. A população-alvo utilizada para cálculo das coberturas vacinais é derivada da Base demográfica do Ministério da Saúde e/ou do Sistema de Informações sobre Nascidos vivos. Para detalhes do cálculo da população alvo, recomenda-se a leitura das Notas Técnicas do SI-PNI (<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/pni/cpnidescr.htm#pop>).
4. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.
5. A vacina tríplice viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola), aplicada em crianças de 1 ano, foi adotada como parte do Programa Nacional de Imunizações a partir de 2002, substituindo a vacina contra sarampo, aplicada em crianças menores de 1 ano.
6. Até 2002, está contabilizada a cobertura da vacina tríplice bacteriana (DPT); a partir de 2003, esta vacina foi substituída pela Tetravalente (DTP + Hib).
7. O indicador apresenta valores acima de 100%, tanto por erros de registro das doses aplicadas como pela imprecisão das estimativas utilizadas da população alvo.

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203RNE - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e tipo de imunobiológico

BCG

Período:2000-2010

Data de elaboração: 30/04/2013
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ





Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203RNE - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e tipo de imunobiológico

Hepatite B

Período:2000-2010




Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203RNE - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e tipo de imunobiológico

Hepatite B

Período:2000-2010



Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Notas:

1. Valores médios elevados podem encobrir bolsões de baixa cobertura em determinados grupos populacionais.
2. A demanda da população não residente aos postos de vacinação, principalmente em campanhas, dificulta a avaliação da cobertura vacinal.
3. A população-alvo utilizada para cálculo das coberturas vacinais é derivada da Base demográfica do Ministério da Saúde e/ou do Sistema de Informações sobre Nascidos vivos. Para detalhes do cálculo da população alvo, recomenda-se a leitura das Notas Técnicas do SI-PNI (<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/pni/cpnidescr.htm#pop>).
4. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.
5. A vacina tríplice viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola), aplicada em crianças de 1 ano, foi adotada como parte do Programa Nacional de Imunizações a partir de 2002, substituindo a vacina contra sarampo, aplicada em crianças menores de 1 ano.
6. Até 2002, está contabilizada a cobertura da vacina tríplice bacteriana (DPT); a partir de 2003, esta vacina foi substituída pela Tetravalente (DTP + Hib).
7. O indicador apresenta valores acima de 100%, tanto por erros de registro das doses aplicadas como pela imprecisão das estimativas utilizadas da população alvo.

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203RNE - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e tipo de imunobiológico

Hepatite B

Período:2000-2010

Data de elaboração: 30/04/2013
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ





Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203RNE - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e tipo de imunobiológico

Tríplice viral/sarampo

Período:2000-2010




Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203RNE - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e tipo de imunobiológico

Tríplice viral/sarampo

Período:2000-2010



Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Notas:

1. Valores médios elevados podem encobrir bolsões de baixa cobertura em determinados grupos populacionais.
2. A demanda da população não residente aos postos de vacinação, principalmente em campanhas, dificulta a avaliação da cobertura vacinal.
3. A população-alvo utilizada para cálculo das coberturas vacinais é derivada da Base demográfica do Ministério da Saúde e/ou do Sistema de Informações sobre Nascidos vivos. Para detalhes do cálculo da população alvo, recomenda-se a leitura das Notas Técnicas do SI-PNI (<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/pni/cpnidescr.htm#pop>).
4. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.
5. A vacina tríplice viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola), aplicada em crianças de 1 ano, foi adotada como parte do Programa Nacional de Imunizações a partir de 2002, substituindo a vacina contra sarampo, aplicada em crianças menores de 1 ano.
6. Até 2002, está contabilizada a cobertura da vacina tríplice bacteriana (DTP); a partir de 2003, esta vacina foi substituída pela Tetravalente (DTP + Hib).
7. O indicador apresenta valores acima de 100%, tanto por erros de registro das doses aplicadas como pela imprecisão das estimativas utilizadas da população alvo.

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203RNE - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e tipo de imunobiológico

Tríplice viral/sarampo

Período:2000-2010

Data de elaboração: 30/04/2013
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ